


## Mintavételi tájékoztató katekolamin vizsgálatához vizeletből

Katekolamin vizeletvizsgálat alatt a stressz-szhelyzetet, fizikai munkát és az edzést minimumra kell csökkenteni. Különböző ételeket, mint pl. a kávé (beleértve a koffeinmentest is), teát, csokoládét, vaníliát, banánt, narancsot vagy egyéb citrusféléket mellőzni kell a vizsgálat előtt több nappal és a mintavételkor.

A vizsgálat a vérnyomás kiugrás okának keresésére alkalmas, illetve phaeochromocytoma (mellékvesevelő daganat), neuroblastoma, ganglion neurinoma gyanújakor merül fel.

A vizsgálatnál az  $\alpha 1$  és  $\beta$ -adrenoceptor blokkoló és antidepresszáns gyógyszerek kihagyása szükséges!



## KATEKOLAMIN VIZSGÁLAT VIZELETBŐL

### A minta gyűjtéséhez az alábbiak szükségesek:

- 1,5-2 literes gyűjtéshez szükséges edény (flakon)
- 25 %-os sósav (HCl)
- 100 ml-s vizeletes pohár

### A 24 órás vizeletgyűjtés módja:

- A reggeli első vizeletet ürítse ki a WC-be, a gyűjtés ezt követően kezdődik. Erre azért nincs szükség, mert a vizelet a gyűjtés előtt keletkezett!
- Ezt követően a vizeletét egy nagyobb edénybe gyűjtse (pl.: 1,5-2 literes flakon) 24 órán keresztül, beleértve az éjszakai vizeletet is.
- A kapott 25 %-os sósavat az első ürített vizelethez kell önteni.
- A gyűjtés befejező ideje a következő napon akkor legyen, amikor a gyűjtés elkezdődött (24 óra).

- A 24 órás gyűjtött vizeletből történő vizsgálatoknál nem szükséges a teljes vizeletmennyiséget a laboratóriumba szállítani, hanem elegendő a 100 ml-s vizeletes pohárba átönteni, viszont a 24 órás vizelet mennyiségét pontosan le kell mérni, mert az ürítés kiszámolásához erre szükség van!

A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a laboratóriumban leadni.

A minta addig szobahőn tárolható.

Menstruáció alatt ne történjen vizeletgyűjtés!



**MEDICOVER**  
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT