

Mintavétel a széklet calprotectinhez

1. Csavarja le a mintagyűjtő cső tetejét.
2. A kupakhoz csatlakoztatott sárga pálcát dugja a székletbe kb. 2 centiméternyire (ameddig „menetes” a vége)!
3. Húzza ki a pálcát a székletből
4. Hajtsa végre az 2.) és 3.) lépést még kétszer, majd csavarja rá a kupakot . Ne tegyen túl sok székletet a csőbe! (ha sok minta tapadna rá, vécépapírral törölje le.
5. A vizsgálat csak akkor értékelhető, ha pontosan annyi széklet van a mintavevőn, ami befedi a menetes részt.
6. Ha a mintavétel napján nem tudja eljuttatni széklet mintáját a laborba, akkor a minta 1-2 napig hűtőszekrényben 2-8°C között tárolható



MEDICOVER
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT

SZÉKLET CALPROTECTIN VIZSGÁLAT MINTAVÉTEL

Pancreasspecifikus elasztáz vizsgálata székletből

Ez a teszt a székletmintában található, hasnyálmirigy által termelt elasztáz I enzim mennyiségét méri és elégtelen emésztőenzim termeléssel járó hasnyálmirigy betegségek diagnosztizálására használható.

A pancreas elasztáz I az emésztőrendszeren károsodás nélkül halad keresztül, amely lehetőséget nyújt a székletből történő fájdalommentes enzimszint meghatározására. A vizsgálat, már az enyhe fokú hasnyálmirigy elégtelenséget (gyulladás, tumor, diabetes) kimutatására is alkalmas.

Széklet pancreas specifikus elasztáz mintavétel

1. Vegyekiaspeciálisszéklettartályt adobozából, valamint a védőtasakból. A tartály végén lévő fület fordítsa el ütközésig.

2. Húzza ki széklettartályból a piros, közepén lyukas dugón keresztül a mintavevő pálcát.
3. A közepén lyukas, piros dugó maradjon a csőben, ezt nem kell kivennie. A mintavevő pálcát egymás után négy helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a pálcá végén az apró rovátkák közötti terület megteljen széklettel.
4. Ellenőrizze, hogy a pálcá végén lévő rovátkák közti rést kitölti-e a széklet.

A vizsgálathoz pontosan a rovátkák között maradó székletmennyiség szükséges. A székletbe csak a pálcát kell beleszúrni, nem kell a csőbe székletet tenni! A vizsgálat nem végezhető el, ha több, vagy kevesebb széklet minta kerül a pálcá recés végére.

A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a laboratóriumunkban leadni. A minta a leadás idejéig szobahőmérsékleten tárolható.

Hasmenéses széklet esetén a vizsgálat nem végezhető el, valamint menstruáció alatt ne történjen székletvizsgálat.